© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



# Tausch-Catalog
## der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Fm. = Finmarken; DB. = Dogger Bank, Oceanus germanicus; Mr. = Mauritius;
** sehr schön oder sehr selten; * schön oder selten; † mittelmässig gut;
†† alt, gering, oder etwas beschädigt; sf. = subfossil.
(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

| | | Mk. |
|---|---|---|
| | *Neptunea* | |
| *despecta, L. in var. | Fm. | 1—3 |
| **norvegica, Chmn. | D.B. | 20—30 |
| **Turtoni, Bean. elongata | „ | 10—20 |
| do. | „ Fm. | 5—9 |
| | *Sipho* | |
| **islandicus, Chm. | Fm. | 10—20 |
| | *Pleurotoma* | |
| *abbreviata, Rve. | Mr. | 0,70 |
| albocostata, Sow. | Mr. | 0,50 |
| †albovirgulata, Souv. | „ | 0,80 |
| *babylonica, L., | Molucken | 1,20-2,40 |
| echinata, Lm. | Mr. | 0,65 |
| †scalata, Sow. | „ | 0,60 |
| †spectabilis, Rve. | „ | 0,60 |
| | *Drillia* | |
| ††albomaculata, D'Orb. | Ant. | 0,10 |
| Barklyensis, H. Ad. | Mr. | 0,50 |
| bijubata, Rv. & v. fusca | „ | 0,50 |
| ††cancellata, Gray | Ant. | 0,10 |
| cincta, Lm. & v. fusca | Mr. | 0,40 |
| ††ornata, D'Orb. | Antillae | 0,10 |
| zebra, Kien. | Mr. | 0,35 |
| diverse unbenannte | à | 0,40 |
| Persona anus, L. | Ocea. ind. | 0,80-1,20 |
| | *Buccinum* | |
| finmarkianum, Verkr. typus | | |
| unicolor | Fm. | 1-1,50 |
| „ var. perdix, Beck. | „ | 2—9 |
| fragile, Verkr. | „ | 1—3 |
| ?†ciliatum, Fabr. | Nfdld. Bk. | 1—2 |
| **Buccinopsis Dalei, Sow. | DB. | 50 u. 80 |
| | *Phos* | |
| roseatus, Hinds | Mr. | 0,60 |
| †senticosus L. | | 0,60 |
| textilinus, Mörch | Antillae | 0,50 |
| | *Nassa* | |
| ambigua, Montg. | S. Thomas | 0,30 |
| antillarum, Phil. | Ant. | 0,25 |
| arcularia L. | Pacific | 0,50-60 |
| compta, A. Adams | Mr. | 0,50-60 |
| concinna, Powis & var. | „ | 0,40-50 |
| coronata, Brug. | Oce. ind. | 0,40 |
| festiva, Powis | Japan | 0,25-40 |
| gaudiosa, Hinds | Oc. ind. | 0,25 |
| Kraussii, Phil. | Panama | 0,50 |
| miga, Adanson | Mr. | 0,30 |
| olivacea & var. | „ | 0,50 |
| papillosa, L. | „ | 0,60-1 |
| picta, Dkr. | „ | 0,50 |
| plicata, Gml. | M. rubr. | 0,35 |
| pulchella, A. Ad. | Mr. | 0,50 |
| pullus, L. & var. | Oc. ind. | 0,25-35 |
| punctata, A. Ad. | Mr. | 0,40 |
| sertula, do. | „ | 0,35 |
| suturalis, Lm. | „ | 0,45 |
| Thersites, Brug. & var. | Philipp. | 0,30-40 |
| tortuosa? Robill. | Mr. | 0,40 |
| | *Purpura* | |
| fiscella, Lm. | Mr. | 0,50-75 |
| „ var. picta | „ | 0,60 |
| haemastoma, L. | Oc. Atl. | 0,30-60 |
| hippocastanum, L. | Oc. ind. | 0,30-50 |
| patula, L. | Ant. | 0,35-60 |
| serta, Brug. (Jopas) | M. rubr. | 0,30-50 |
| †squamosa, Lm. | Algoa Bai | 0,25 |
| squamulosa, Dsh. | Mr. | 0,75 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|
| undata, Lm. Antillae | 0,25-50 | utriculus, ?Lm. Pacific | 1 |
| vexilla, Lm. Mr. | 0,60 | venulata, Lm. Ant. | 0,25 |
| *Ricinula* | | *Olivella* | |
| albolabris, Blvl. Oc. ind. | 0,50 | columellaris, Sow. Panama | 0,10 |
| carolina, ?Robl. Mr. | 0,80-1 | mutica, Say Antillae | 0,15 |
| horrida, Lm. minor Oc. ind. | 0,20-40 | nivea, Gmel. „ | 0,10-15 |
| „ major „ | 0,60 | „ var. picta „ | 0,25 |
| „ cum operculo plus | 0,15 | oryza, Lam. „ | 0,5 |
| lobata, Blvl. Mr. | 0,50 | ozodona, Ducl. Mr. | 0,25 |
| recurva, Rve. „ | 0,75 | panniculata, Ducl. Ind. oc. | 0,25 |
| Rapana coronata, Lm. „ | 0,50 | volutella, Lm. Panama | 0,10 |
| Rapa papyracea, Lm. „ | 2 | Dipsacus glabratus, L. Oc. ind. | 0,70-1 |
| *Coralliophila* | | Latirus nodosus, Rob. Mr. | 0,70 |
| ? costularis, Blnv. Mr. | 0,60-80 | *Columbella* | |
| madreporarum, Sow. „ | 0,40-80 | turturina, Lm. Mr. | 0,25 |
| *Oliva* | | mercatoria, L. Ant. | 0,10 |
| aperta, Robil. Madagasc. | 0,50 | mendicaria, L. Oc. ind. | 0,15 |
| „ v. arabica Arabia | 0,60 | nitida, Lm. Ant. | 0,10 |
| carneola, Gmel. Philipp. | 0,25-30 | rustica, L. Africa | 0,20 |
| elegans, Lm. Ind. ori. | 0,25-40 | *Cassis* | |
| episcopalis, Lm. & v. min. Mr | 0,25-50 | bezoar, Robld. Mdagscr. | 0,75 |
| erythrostoma, Lm. Oc. ind. | 0,40-60 | canaliculata, Lm. „ | 0,75 |
| „ v. ponderosa „ | 0,50-80 | *cornuta, L. „ | 2,50 |
| „ v. maura „ | 0,50-80 | erinacea, L. Mr. | 0,50-60 |
| funebralis, Lm. „ | 0,25-40 | ? flammea, L. Occ. ind. | 0,50-75 |
| fusiformis, Lm. „ | 0,50 | glauca, L. Philipp. | 2 |
| guttata, Lm. Australien | 0,35-50 | granulosa, Brug. M. med. | 0,70 |
| inflata, Lm. Oc. ind. | 0,40-50 | ? madagascariens., L. Mdgsc. | 2 |
| irisans Lm. Mr. | 0,40-50 | saburon, L. Occ. atlant. | 0,70 |
| ispidula, L. in 10 var. Oc. ind. | 0,10-20 | testiculus, L. Ind. occid. | 0,40-1 |
| ponderosa, Ducl. & var. Mr. | 0,60-80 | *torquata, Rve. Mr. | 1—2 |
| porphyria, L. Pacific | 1-2,50 | undata, Mart. „ | 0,40-60 |
| reticularis, L. Ind. occ. | 0,10-25 | Coriocella nigra, Blvl. „ | 0,45 |
| „ v. candida „ | 0,25 | *Natica* | |
| sanguinolenta, L. Oc. ind. | 0,40-80 | aurantia, L. Occ. ind. | 0,90 |
| sepulturalis, Lm. Moluc. | 0,30-50 | canrena, L. Ind. occ. | 0,30-90 |
| tessellata, „ Philipp. | 0,25-30 | cernica, Jousseaume, Mr. | 0,60-80 |
| tremulina, Lm. & v. fusca Mr. | 0,80-1 | — v. violacea, „ | 0,50 |
| tricolor, „ Oc. ind. | 0,25-40 | chrysostoma ? Gml. Sulu-I. | 0,20-40 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | | Mk. | | | Mk. |
|---|---|---|---|---|---|
| fluctuata, Sow. | Philipp. | 1,20 | arabicula, Lm. | Pacific | 0,35 |
| fuscata, Recl. | Panam. | 0,50 | arenosa, Gray. | „ | 1-1,25 |
| gualteriana, „ | Mr. | 0,50 | argus, L. | M. ind. | 1-1,50 |
| lineata, Lam. | Philipp. | 0,50-60 | asellus, L. | „ | 0,10-20 |
| lurida, Phil. | Mr. | 0,30-50 | camelopardalis Perry. | M. rub. | 0,60-1 |
| mamilla, L. | Occ. ind. | 0,15-50 | caput serpentis, Lm. | M. ind. | 0,10-20 |
| Manceli, Jousseanme, | Mr | 0,80-1 | carneola, L. | „ | 0,20-40 |
| melanostoma Gml. | Oc. i. | 0,20, | caurica, L. | „ | 0,15-30 |
| — var. flava (maura Brug.) | Mr. | 0,50-60 | cernica, Sow. | Mr. | 0,50-1 |
| — cum operc., | omnes | plus 0,10 | cervus, L. | M. ind. | 0,60-1 |
| Priamus, Recl. | Mr. | 0,50, 1,50 &2 | clandestina, L. | „ | 0,10-15 |
| pyriformis, „ | „ | 0,60 | — var. grandis. | „ | 0,35 |
| simiae, Chm., | „ | 0,50-60 | cribraria, L. | Oc., ind. | 0,50-80 |
| violacea, Sow. | „ | 1,20 | cribellum, Gask. | Mr. | 0,40-50 |
| Sigaretus cymba, Mke. | Chili | 1,50 | cruentata, Gml | „ | 0,30-40 |
| Narica cancellata, Chm. | Mr. | 1 | — v. rosea, „ | „ | 0,40-50 |
| Neritopsis radula, L. | „ | 1,20 | cylindrica, Born. | Philipp. | 0,90 |
| *Terebra* | | | eburnea, „ | „ | 0,60-1,50 |
| †aciculata, Lam. | Antilles | 0,10 | erosa, L. & vars. | M. ind. | 0,15-40 |
| affinis, Gray. | Pacific | 0,45 | — v. grisea. | „ | 0,50 |
| babylonica, Lm. | „ & Mr. | 0,40-60 | *— v. aurea. | „ | 1 |
| caerulescens, „ | „ | 0,40-50 | errones, L. | Oc. ind. | 0,10-30 |
| cinerea, Born. | Oc. ind. &c. | 0,30 | *esontropia, Ducl. | Mr. | 1,80 |
| cingulifera, Lm. | „ | 0,40-80 | exanthema, L. | Ind. occ. | 0,60-1 |
| Lamarckii, Kien. | „ | 0,35 | felina, Gml. | M. rub. | 0,25-35 |
| *lanceata, Gml. | Mr. | 1,50-2 | fimbriata, „ | „ | 0,20-30 |
| maculata, L. | Occ. ind. | 0,50-1 | helvola, L. | M. ind. | 0,10-20 |
| muscaria, Lm. | Pacific | 1 | *— var. rubra. | Mr. | 0,30-40 |
| subulata L. | „ | 0,50-1 | hirundo, L. & var. | Oc. ind. | 0,10 |
| *Eulima* | | | — var. maxima. | Mr. | 0,20 |
| ? acuta, Sow. | Mr. | 0,50 | histrio, Gml. | Oc. ind. | 0,40-1 |
| flexuosa, A. Adms. | „ | 0,55 | irrorata, Sol. | Pacific | 0,80 |
| hastata, Sow. | „ | 0,60 | Isabella, L. | Oc. ind. | 0,15-40 |
| major, Sow. | „ | 0,60 | Lamarckii, Gray. | Philipp. | 0,50 |
| Rostell. curvirostris | L. M. rub. | 1-2 | lentiginosa, „ | Oc. ind. | 0,15-30 |
| *Cypraea* | | | limacina, Lam. | „ | 0,45 |
| amacula, Adms. | Ceylon | 0,35 | Listeri, Rve. | Philipp. | 1 |
| annulus, L. | M. ind. | 0,10 | lurida, L. | Oc. atlan. | 0,15-30 |
| arabica, L. | „ | 0,15-25 | lynx, L. | Oc. ind. | 0,10-25 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | | Mk. | | | Mk. |
|---|---|---|---|---|---|
| mappa, L. | Oc. ind. | 1-3 | europaea, Mft. | Europa | 0,10 |
| mauritiana, L. | „ | 0,60-1,20 | globulus L. | Oc. ind. | 0,50 |
| *Menkeana, Desh. | Mr. | 1 | *Liénardi, Jouss. | Mr. | 0,60-80 |
| microdon, Gray. | Philipp. | 0,30 | nucleus, L. | „ | 0,20-40 |
| moneta, L. & var. | Oc. ind. | 0,5-15 | „ v. alba | „ | 0,50 |
| *neglecta, Sow. | Mr. | 0,50 | oryza Lm. | „ | 0,10 |
| obvallata, Lm. | Oc. ind. | 0,30 | „ var. minor. | Viti-Ins. | 0,15 |
| ocellata, L. | „ | 0,30 | pediculus, L. | Ind. occ. | 0,10 |
| onyx, L. | M. asiat. | 1 | pustulata, Solan. | Panama | 0,30-60 |
| — v. carnicolor. | „ | 1,20 | quadripunctata, Gray | Ind.occ. | 0,10-20 |
| *Oweni, Gray. | Mr. | 1,20 | Solandri, Gray | Calif. | 0,20-30 |
| pantherina, Sol. | M. ind. | 0,40-80 | staphylea, L. | Oc. ind. | 0,25 |
| poraria, L. | „ | 0,10-20 | „ v. levis & v. grisea | „ | 0,30 |
| punctulata, Gray. | Panama | 0,40-50 | „ v. fusca major | „ | 0,35 |
| reticulata, Martyn. | Pacific | 0,80-1 | suffusa, Gray | Ant. | 0,10 |
| **Scottii, Brod. | „ | 15 | *tricornis, Jouss. | Mr. | 0,65 |
| scurra, Chm. | Oc. ind. | 0,50-1,50 | **tricornis, v. pellucida | „ | 1 |
| semiplota, Migh. | Sandw.-I. | 0,50 | *Ovula* | | |
| spurca, L. | M. med. | 0,20-40 | Margaritulae, Sow. | Mexico | 0,15-20 |
| stercoraria, L. | Afrika | 0,40-80 | ovum, L. | Occ. ind. | 0,50-1 |
| *stolida, L. | Mr. | 0,80-1,30 | Calpurnus verrucosus, L. | „ | 0,80 |
| tabescens, Soland | Occ. ind. | 0,20-40 | Cyphoma gibbosa | Ind. occ. | 0,15-25 |
| talpa, L. | „ | 0,40-60 | Cancellaria scalata, Sw. | O.ind. | 0,80 |
| testudinaria, L. | „ | 2-4 | „ costifera, Sow. | Mr. | 1,20 |
| tigris, L. | „ | 0,40-80 | „ „ var. | „ | 0,70 |
| „ var. grisea | „ | 1,20 | *Cerithium* | | |
| turdus Lm. | „ | 0,15-30 | alternatum, Phl. | Mr. | 0,60 |
| undata „ | „ | 0,20-40 | aluco, L. | Pacific | 0,45 |
| ursellus, Gmel. | „ | 0,20-30 | asper, L. | „ | 0,20-30 |
| variolaria, Lm. | „ | 0,15-30 | atratum, Born | Ant. | 0,20 |
| ventricula, Lm. | Austral. | 0,70-1 | Caillaudi, Pott. | M. rub. | 0,20 |
| vitellus L. | Oc. ind. | 0,25-50 | cedo nulli, Sow. | Mr. | 0,60 |
| ziczac, L. | „ | 0,10-20 | columna, Sow. | M. rubr. | 0,40 |
| *Trivia* | | | „ v. flava | Mr. | 0,30-40 |
| annulata, Gray | Pacific | 0,80-1 | decollatum, L. | Oc. ind. | 0,25-35 |
| australis, Lm. | N. Holland | 0,50 | echinatum, Lm. | Mr. | 0,50 |
| californica, Gray | California | 0,10-15 | eriense, Val. | Ant. | 0,5 |
| Childreni, Gray | Maurit. | 0,40-80 | fluviatile, Pot. | Occ. ind. | 0,35 |
| cicercula, L. | Occ. ind. | 0,30-50 | fuscatum, Costa | M. rubr. | 0,20 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | Mk. |
|---|---|
| gallopaginis ? Ceylon | 0,35 |
| gibberulum, C. B. Ad. Ant. | 0,5 |
| Kochii, Phil. M. rubr. | 0,25 |
| litteratum, Brug. Ant. | 0,20 |
| moluccanum, Gmel. Phil. | 0,50 |
| moniliferum, Kien. Austr. | 0,30 |
| multiformis, Lischke Japan | 0,40 |
| obeliscus, Brug. Oc. ind. | 0,40 |
| „ v. maximus Mr. | 0,50-60 |
| palustre, L. M. ind. | 1 |
| petrorsum, Wood Pacific | 0,45 |
| procerum, klein & var. Oc. ind. | 0,50 |
| ? pulchellum, Rob. S. Africa | 0,50 |
| Rüppellii, Phil. M. rub. | 0,25 |
| septemstriatum, Say Ant. | 0,15 |
| striatissimum, Sow. „ | 0,25 |
| tuberculatum, Lm. M. rub. | 0,40 |
| varicosum, Sow. Panama | 0,40 |
| vertagus, L. Moluck. | 0,20-30 |
| vulgatum, L. M. med. | 0,20-30 |
| Cerithidea ambigua, Ad. Jam. | 0,15 |
| Litorina pintato, Wd. (Ph.) Mr. | 0,30 |
| „ scabra, L. „ | 0,30 |
| Calyptraea auricul. Mke. Ant. | 0,40 |
| „ tectum sinense, Chm. mj. M | 0,70 |
| Pileopsis incurva, Dkr. Mr. | 0,30 |
| „ lamellosa, Chm. „ | 0,30 |
| „ subrufa, Lm. „ | 0,25 |
| Nerita histrio, L. „ | 0,30 |
| „ plicata, L. „ | 0,30 |
| Haliotis ? mauritiana ? „ | 0,40 |
| Fissurella ? mauritiana ? „ | 0,40-50 |
| Parmophorus brevic. Rob. „ | 0,40 |
| Aplustrum aplustre, L. „ | 0,40 |
| Hydatina physis, L. „ | 0,50 |
| Dolabella gigas, Rang. „ | 2 |
| „ Rumphii, Cuv. „ | 1 |
| Aplysia ? tigrina, Rang. „ | 0,75 |

| | Mk. |
|---|---|
| *Helix* | |
| Adans., Wbb. Paso alto Tener. | 1 |
| Berlieri, Mar. Algerica | 0,80 |
| calcidica, Mouss. Euboea | 0,35 |
| carsoleana, Fér. Italia | 0,30 |
| Codringtoni, Gray & v. Grecia | 2 |
| frondul., Mss. (Hyal.) Euboea | 1 |
| gregaria, Ziegl. Sicilia | 0,45 |
| lenticula, Fér. Chalcis | 0,20 |
| lucorum, Müll. v. Cnstntinopl. | 0,80 |
| lens, Fér. Euboea | 0,40 |
| „ v. lentiform., Zgl. „ &Zanté | 0,50 |
| modesta, Fér. Barr. S. Tener. | 0,80 |
| musicula Brg. (crenoph. Pfr.) | 0,30 |
| Olivieri, Fér. Euboea | 0,40 |
| Orsinii, Porr. Italia | 0,50 |
| pellita, Fér. Rhodus | 1 |
| Rothi, Pfr. Syra | 0,80 |
| rugosiuscula Mich. Marsolan. | 0,50-80 |
| rusicadens. Letour. n. sp. Alg. | 1 |
| sphæriostoma Bourg. Grecia | 0,45 |
| sulcifera, Adms. sf. arc. Mr. | 1 |
| zonitomea, Letourn. Kabylia | 1,30 |
| stenostoma, Pfr. Hayti | 0,80 |
| *Pupa* | |
| Rhodia, Roth. Grecia | 0,40 |
| dolium, Dp. v. scyphus Friv. „ | 0,40 |
| *Clausilia* | |
| biplic. Mg. v. albina Po. Wstf. | 0,55 |
| castrensis, Parr. Corfu | 0,40 |
| cinerea, Phil. Böotia | 0,40 |
| — v. candidesc. Zgl. Italia | 0,35 |
| coerulea, Fér. Ins. Grec. | 0,35 |
| corcyrensis, Mouss. Corfu | 0,45 |
| Draparnaudi, Beck Milos | 0,75 |
| euboica, Porr. Euboea | 0,35 |
| inflata, Olivi Creta | 0,45 |
| isabellina, Pfr. Attica | 0,40 |
| laconica, Mouss. Mysseno | 0,40 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|
| maculosa, Desh. Böotia | 0,45 | Cryptogramma flexuosa, Brus. | 0,30 |
| Moreleti Pfr. Corfu | 0,45 | Chione asperrima, Sow. I. occ. | 0,50 |
| negropontina, Pfr. Euböa | 0,35 | „ granulosa, Lm. „ | 0,30 |
| oxystoma, Rssm. „ | 0,40 | „ ziczac, L. „ | 0,40 |
| Pikermiana Roth. „ | 0,35 | Artemis torcuma, Gld. Mr. | 0,45 |
| plicata, Dp. v. coarctata Grec. | 0,35 | „ variegata, Chm. „ | 0,50 60 |
| — v. sine plicis Ob.-Baiern | 0,30 | Venerupis carditoides, Lm. „ | 0,35 |
| Rythimensis, Blanc. Creta | 0,40 | *Cypricardia* | |
| straminea, Parr. „ | 0,40 | angulata, Lm. Mr. | 0,50-1,20 |
| Schuchii, v. Voith Zante | 0,40 | modesta? Rb. (?guinaica „) „ | 1,20 |
| tetragonostoma, Pfr. Böotia | 0,30 | „ v. dolosa? Rb. „ | 1,20 |
| Martesia striata, L. Ind. occ. | 0,20-40 | rostrata, Lm. „ | 0,90 |
| *Tellina* | | Corallioplaga laminata, Rv. „ | 0,80-1,20 |
| dispar, Conr. Mr. | 0,30-40 | Choristodon divar., ? Rb. „ | 0,60 |
| fausta, Don. Ant. | 0,50-1 | *Cardium* | |
| radiata, L. Pacific etc. | 0,50-1 | bicolor, Sow. & var. Mr. | 0,40-50 |
| rugosa, Born Mr. | 0,30-50 | loncostomum, Born „ | 0,60-1 |
| scobinata, L. Tahiti & Mr. | 90-1,20 | muricatum, L. Ind. occ. | 0,30 |
| stanrella, Lm. „ | 0,50 | pulchellum (arenicul.) Rv. Mr. | 0,40 |
| virgata L. „ | 0,70-1 | rugosum, Lm. „ | 0,50-60 |
| Strigilla carnaria, L. Ind. occ. | 0,50-80 | variegatum, Sow. „ | 0,50-60 |
| „ pisiformis, L. „ | 0,10 | *Chama* | |
| Donax faba, Chm. Mr. | 0,25 | ? aspersa, Rve. Mr. | 0,30-40 |
| Amphidesma borbonic. D. „ | 0,50 | fibula, „ „ | 1-1,50 |
| Callista costata, Chm. „ | 2 | ? imbricata, Brod. | 1,20 |
| Caryatis varians, Hanl. „ | 0,45 | macrophylla, Chm. Ind. occ. | 0,50-1 |
| „ „ v. radiata „ | 0,55 | Lucina globosa, Gray Mr. | 0,40 |
| *Lioconcha* | | Lithodomus lithophagus, „ | 0,50 |
| arabica, Chm. sinus persicus | 0,50 | „ niger, D'Orb Ind. occ. | 0,40 |
| „ „ Mare rubr. | 0,30 | Aricula? Mauritiana ? Rb. Mr. | 1 |
| castrensis, L. Occ. ind. | 1,50 | Meleagrina margaritif. Dh. „ | 1 |
| ? laeta, L. Mr. | 0,60 | „ ? sp. „ | 0,80 |
| picta, Lam. clara „ | 0,40 | Perna Maillardi, Dsh. „ | 0,35 |
| „ „ media „ | 0,50 | „ vulsella, Lm. v. „ | 0,50 |
| „ „ fusca „ | 0,55 | Atrina saccata, Lm. „ | 1,20-1,50 |
| Crista divaricata, Lm. M. ind. | 0,60 | Barbatia barbata, L. „ | 0,50 |
| „ gibbia, Lm. „ | 0,50 | „ revelata, Dsh. „ | 0,40 60 |
| „ pectinata, L. Mr. | 0,50 | *Pecten* | |
| „ Savignii, Jon. M. rub. | 0,30-40 | argenteus, Rve. Mr. | 2,50 |

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



| | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|
| concinnus, Rve. minor Viti-I. | 1 | Alectryonia cristata, Lm. „ | 0,40-60 |
| concinnus, Rve, grandis Mr. | 2,80 | „ depressa, „ „ | 0,40-60 |
| corallinoides, D'Orb. „ | 1-2,50 | Nachträglich: | |
| luculentus, Rve. „ | 0,80-1,20 | **Fus. berniciensis, King DB. | 50-100 |
| pallium, L. Philipp. | 2-2,50 | *Spondylus ducal., Chm. Phil. | 4 |
| radula, L. Molucken | 1,50 | ** „ aurantius, Lm. „ | 12 |
| rubromaculatus, Sow. Mr. | 1 | „ longispina, „ China | 2,40 |
| Senatorius, Gmel. „ | 0,50-80 | *Chama Lazarus L. In. or. | 4,50 |
| squamosus, Gm. (madrepo- | | ** „ Prachtstück | 9 |
| rarum, Petit) Mr. | 0,70-1,20 | **Pholas costata L. Massach. | |
| subnodosus, Sow. Am. cent. | 1,50 | Prachtstück | 10 |
| tigris, Lm. Philipp. | 1,80 | *Scalaria pretiosa, Lm. China | 5 |
| Vola ziczac, L. Ind. occ. | 1 | **Conus Victoria, Rv. In. or. | 9 |
| Pleuronectia, pleur., L. China | 1 | ** „ amarillis, „ „ | 7,50 |
| Pedum spondiloid., Gm. Diego | 2-2.80 | * „ bullatus L. Phil. | 4 |
| Plicatula ramosa, Lm. Mr. | 0,30-50 | **Panopea norveg., Spl. DB. | 15 |
| Ostrea parasitica, Ch. in tur- | | Cylindrella hyalina, ? (trans- | |
| mis diversis, Mr. u. Antill. | 0,20-2 | parens, Pfr.) St. Domingo | 0,45 |
| Ostrea in Spondylus Mr. | 1,50 | Macrocer. Guildingi Pfr. Cuba | 0,45 |

## Kleine Mittheilungen.

### Limnaea catascopium Say und elodes Say.

Ueber diese beiden sogenannten Arten schreibt mir Herr Ed. A. Kilian in Buffalo:

„Beobachtungen an Limnaea catascopium Say und elodes Say führen mich zu der Ueberzeugung, dass beide zu einer Art gehören. L. catascopium lebt zahlreich im Eriecanal. Unter diesem Canale fliesst ein Bergwasser hinweg, das im Herbst und Frühjahr, wo es durch Schnee und Regen anschwillt, alles Zerbrechliche in seinem Gebiete zu Pulver zermalmt. In jedem Frühjahr nun, wo L. catascopium ihre Eier auf kleine Stückchen Flossholz ablegt, werden diese oft über den Rand des Aquaductes hinübergespült und gelangen in den kleinen Bach, in welchem sie, wenn sie nicht gleich mit fortgeschwemmt werden, hinter Steinen am seichten Ufer einen Ruheplatz finden und sich dort entwickeln. Die Jungen sind anfangs ächte catascopium, nach und nach entwickeln sie aber immer längere Windungen und werden schliesslich zu ächten elodes. — Auch hier kommt die Darwin'sche Theorie zur Geltung." K.

## Gesellschafts-Angelegenheiten.

### Neue Mitglieder.

Herr *Otto Bachmann*, Reallehrer, Landsberg a. L.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.